

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Τ Ι Τ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Ι Ν Σ Ο Υ Λ Ι Ν Η Σ

- Αφορά ινσουλίνες: Lantus ή Levemir
- Ελέγχετε τα σάκχαρα νηστείας του αμέσως επόμενου πρωϊνού μετά από την χορήγηση της ινσουλίνης μακράς δράσης (Lantus, Levemir)

Στόχος μας: Πρωινό σάκχαρο νηστείας να βρίσκεται μεταξύ : 100 - 140

- ◆ Εάν 2 συνεχόμενες ημέρες πρωινά σάκχαρα νηστείας (άνω) > 140 γίνεται αύξηση της Lantus ή Levemir κατά 2 μονάδες.
- ◆ Εάν 2 συνεχόμενες ημέρες πρωινά σάκχαρα νηστείας (κάτω) < 100 τότε γίνεται μείωση της Lantus ή Levemir κατά 2 μονάδες.
- ◆ Όσο το πρωινό σάκχαρο νηστείας βρίσκεται μεταξύ 100 – 140 συνεχίζουμε με τις ίδιες μονάδες που χορηγήθηκαν την τελευταία φορά.